



Verordnung der Parametereinstellung t:slim X2

mit Basal-I $\mathbb{Q}^{^{\mathrm{TM}}}$ Technologie

| Name des Patienten (Vor-, Zweit-, Nachname) | | | | | | | Geburtsdatum (Tag.Monat.Jahr) |
|---|---|--------|---|-----------------------------|------|--|--|
| l Insulinan | ngaben | | | | | | |
| ☐ Insulinstart ☐ Humalog® ☐ NovoRapid® ☐ Start mit NaCl (Rezept | | | | | | t mit NaCl (Rezept für | NaClerforderlich) |
| Übliche DEinh Mit einer tem nach der letz | Posis Langzeitinsulinheiten. Apporäre Basalrate von Eten Injektion mit Langzeitin Veisung des Arztes | n nehm | en. en, die | Stunden | Lang | gzeitinsulin vor Pum Stunden vor Pumpensc f Einheiten vor Pumpenstiges | penstart anpassen. hulung absetzen. |
| 2 Persönliches Profil und Boluseinstellungen Zeitsegmente | | | | | | | |
| Uhrzeit | Basalrate (0; 0,1–15 IE) | (1:0,1 | Korrek t –1:33,3 mmc | turfaktor // ;1:1–1:600 | | KH-Verhältnis (1–300 g) | BZ-Zielwert (3,9–13,9 mmol/l; 70–250 mg/dl) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Boluseinstellu | | | | | | | |
| | sulinwirkung | | Stunden (2–8 Stunden in 1-Minuten-Schritten, Standard 5 Std.) | | | | |
| Kohlenhydra | □ AUS □ EIN | | | | | | |
| 3 Sonstige | Einstellungen | | | | | | |
| Basalgrenze | Einheiten/Stunde (0,2-15 E/Std) | | | | | | |
| Maximaler Bolus | | | Einheiten (max. Bolus: 25 Einheiten, Standard 10 Einheiten) | | | | |
| Sofort Bolus | AUS EIN Gramm Kohlenhydrate: 2 5 10 15 oder Einheiten Insulin: 0,5 1 2 5 | | | | | | |
| Basal-IQ Ted | AUS EIN (Standard: Basal-IQ-Funktion EIN, Warnung Unterbrechen/Fortsetzen AUS) | | | | | | |
| Auto-Absch | AUS EINStunden (5-24 Std., Standard 12 Std.) | | | | | | |
| Weitere An | weisungen: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| × | | | | | | | |
| Unterschrift des Arztes Datum (Tag.Monat.Jahr) | | | | | | | |